

FENDONA[®] 6 SC

INGREDIENTE ACTIVO	Alfacipermetrina
NOMBRE QUIMICO	(1R cis) Sy (1R cis) R par de isómeros enantiómeros de (alfa)-ciano-3-fenoxibencil-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
GRUPO QUIMICO	Piretroide
CONCENTRACION Y FORMULACION	6% p/v
FABRICANTE/FORMULADOR	BASF S.A., Brasil
DISTRIBUIDOR EN CHILE	BASF Chile S.A
ANTIDOTO	No hay antídoto específico. Utilizar anti-histamínicos si es necesario. En caso de ingestión se puede realizar lavado gástrico cuidadosamente, tratamiento posterior sintomático según cuadro clínico del paciente.
AUTORIZACION ISP	P-279/16

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fendona[®] 6 SC es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos.

Tiene alto poder de volteo, prolongada acción residual en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo o superficies encaladas).

Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto.

No mancha ni deja olor.

DOSIS

Para el control de baratas de las especies *Blatella germánica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas en el ambiente.

Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar o se desee una persistencia prolongada utilicen una cantidad de 50 cm³ de Fendona[®] 6 SC diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m². En tratamientos de mantenimiento utilizar la dosis de 25 cm³ de Fendona[®] 6 SC diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m².

INSTRUCCIONES DE USO

Problema	Tipo de Superficie		Observaciones (*)
	Fina (Uso Doméstico)	Absorbente (Uso Agropecuario)	
Insectos voladores y rastreros como chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos y pulgas en el ambiente	50 cc / 5 L agua para 100 m ²	100 cc / 10 L agua para 100 m ²	Pulverizar dirigido a las superficies como techos, paredes y lugares donde se encuentren los insectos.
Vinchucas	-----	100 cc / 10 L agua para 100 m ² .	Asegurar buen mojamiento.
Baratas (<i>Blatella germánica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatta orientalis</i>)	50 cc / 5 L agua para 100 m ²	100 cc / 10 L agua para 100 m ²	Aplicar en los lugares donde transitan las baratas. Asegurar buen mojamiento.

(*) También se puede aplicar Fendona® 6 SC a las dosis recomendadas con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc)

® Marca registrada de BASF